

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63

ABONNEMENT ANNUEL

Poste 93)

12 NF

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire
STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

13 Juin 1962

Supplément n° 1 au Bulletin du mois de JUIN.

HOUBLON.

/Avertissement/

MILDIOU

Le temps sec qui s'est manifesté ces derniers jours a limité les contaminations de Mildiou, et, de ce fait, les plantations sont relativement saines. Toutefois, la présence de pousses spiciformes et de quelques taches dans certaines cultures motive une nouvelle protection fongicide.

Effectuer un traitement dans la période du 15 au 17 Juin.
Poursuivre l'enlèvement des pousses malades.

/Information/

PUCERONS.

Les températures minima anormalement basses en ce début de Juin ont empêché un développement grave de ces insectes, que l'on ne rencontre que par endroits. Maintenir la surveillance des plantations et n'intervenir qu'après reconnaissance des premiers foyers.

VIGNE.

OTIDIUM.

Renouveler la protection, notamment sur les cépages sensibles et dans les situations les plus exposées.

CONCOURS DE DETECTION DES PREMIERES TACHES DE MILDIOU.

Les conditions météorologiques particulières de ces dernières semaines ont empêché jusqu'ici toutes contaminations primaires. Celles-ci pourront se produire à la faveur des prochaines pluies. Poursuivre le contrôle des parcelles, de façon à pouvoir détecter les premières taches.

Participez au concours en envoyant vos échantillons à la Station d'Avvertissements Agricoles.

.../...

89

ARBRES FRUITIERS.

Avertissement

TAVELURE DES POMMIERS ET DES POIRIERS.

Les premières taches de Tavelure sont apparues.

Indépendamment des possibilités de contamination primaire, on peut craindre des repiquages dès que les conditions seront favorables. (pluie)

La protection doit être maintenue efficace. Appliquer un nouveau traitement fongicide dans la période du 16 au 19 Juin.

Information

PUCERONS.

Des apparitions de Pucerons sont observées sur certaines essences. Maintenir la surveillance des plantations pour pouvoir intervenir rapidement. Tenir compte des prescriptions antérieures.

ARBUSTES A PETITS FRUITS.

GROSEILLIERS - CASSISSIERS.

PUCERONS.

La présence de foyers de Pucerons dans de nombreuses plantations peut motiver une application aphicide. - Utiliser un produit efficace en tenant compte des restrictions d'emploi à l'approche de la maturité des fruits. - Le Mevinphos peut être employé jusqu'à 7 jours avant la récolte.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,
J. BERNARD ET J.M. GRENOUILLOUX.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux.
J. HARRANGER

Imprimerie de la Station de Strasbourg
Cité Administrative
Directeur-Gérant : L. BOUYX.

(REGION LORRAINE SEULEMENT)

MILDIOU DU HOUBLON.

Dans certaines plantations de Lorraine, où la maladie est très apparente, il est conseillé de provoquer le renouvellement de la végétation, en coupant au besoin, au ras du sol, les tiges malades (fortement atrophiées).

20